

	Medicin, KS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.				Niveau: Instruks  Godkendt af: Hanne Andersen 02.05.2021
	IV hjemmebehandling - pakkelister				
Dokumentbrugere: SLB/Vej/Med, SLB/Kold/Med, SLB/Kold/Akut.afd Læseadgang: Alle, Internet	Forfatter: Pernille Bøgh F Diefenbach-Vork	Dokumentansvarlig: SLB/Kold/Med/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 842897 /	Version: 1	

- 1) Formål
- 2) Fremgangsmåde
 - 2.1) Piperacillin/Tazobactam
 - 2.2) Benzylpenicillin
 - 2.3) Cefuroxim
 - 2.4) Meropenem
 - 2.5) Bactrim
 - 2.6) Diclocil
- 3) Dokumentation
- 4) Referencer og litteratur

1) Formål

Pakkelister til IV hjemmebehandling med antibiotika.

2) Fremgangsmåde

2.1) Piperacillin/Tazobactam

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

2.2) Benzylpenicillin

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

2.3) Cefuroxim**Gives i PVK:**

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt (alm eller cefuroxim)
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 1 x 50 ml. NaCl til efterskyl pr. behandling hvis der ikke bruges cefuroxim sæt

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling
- 1 x 50 ml. NaCl til efterskyl pr. behandling hvis der ikke bruges cefuroxim sæt

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt

- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)
- 1 x 50 ml. NaCl til efterskyl pr. behandling hvis der ikke bruges cefuroxim sæt

2.4) Meropenem

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 100 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x overføringskanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 1 x 100 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x overføringskanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 100 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x overføringskanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

2.5) Bactrim

Gives i PVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 100 ml NaCl pr. behandling
- 1 x ampulknækker pr. behandling
- 1 x 5 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 100 ml NaCl pr. behandling
- 1 x ampulknækker pr. behandling
- 1 x 5 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 100 ml NaCl pr. behandling
- 1 x ampulknækker pr. behandling
- 1 x 5 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

2.6) Diclocil**Gives i PVK:**

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 3 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 250 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x 10 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- 1 x 10 ml. sterilt vand pr- behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen

Gives i Picc-Line:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 1 x 250 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x 10 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- 1 x 10 ml. sterilt vand pr- behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk. pr. behandling

Der sendes følgende med til skift af forbindelse (skiftes x 1 ugentligt):

- Statlock
- Steril injektionsprop/membran
- CVK plaster
- 1 x 10 ml NaCl sprøjte
- Informations pjece om Picc-Line
- 1 x stor swab

Gives i CVK:

- IV medicin til hele behandlingen
- Infusionssæt
- Swab – 2 stk pr. behandling
- 10 ml. NaCl sprøjter – 2 stk pr. behandling
- 1 x 250 ml. NaCl pr. behandling
- 1 x 10 ml. sprøjte pr. behandling
- 1 x rød kanyle pr. behandling
- 1 x 10 ml. sterilt vand pr- behandling
- IV vejledning
- Informations seddel om intravenøs hjemmebehandling
- Afstemt FMK med slutdato for IV behandlingen
- CVK plaster til skift (skiftes hver 7. dag – eller før hvis det er vådt, løst eller andet)

3) Dokumentation**4) Referencer og litteratur****Ændringslog**

Version	Godkendt	Revisionsinformation
1	02.05.2021	